



ZASADY BIOASEKURACJI DLA MYŚLIWYCH W ZWIĄZKU Z ASF - PATROSZENIE DZIKÓW

W związku z coraz bardziej rozprzestrzeniającym się wirusem ASF na terenie naszego kraju, przypominamy wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w łowisku, po dokonaniu odstrzału oraz w czasie patroszenia.



Wytyczne odnośnie zasad bioasekuracji przez myśliwych podczas polowania na dziki dotyczą obszarów objętych ograniczeniami, obszarów zagrożenia i obszarów ochronnych.



ZACHOWANIE ZASAD BIOASEKURACJI W ŁOWISKU, PO DOKONANIU ODSTRZAŁU

- a) Na obszarze objętym ograniczeniami i zagrożenia dziki odstrzelone nie mogą być patroszone w łowisku lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików;
- b) Na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików zapewnia się miejsce do patroszenia dzików z zachowaniem zasad bioasekuracji, oznaczone tabliczką z napisem „Miejsce patroszenia”;
- c) Minimalne wymagania przy patroszeniu dzików zostały opisane w "zasady zachowania bioasekuracji podczas patroszenia" Zasady zachowania bioasekuracji w czasie patroszenia;
- d) Każdy odstrzelony dzik u którego przed dokonaniem odstrzału stwierdzono objawy nasuwające podejrzenie wystąpienia ASF, po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF, przeznaczony jest do utylizacji;
- e) Na obszarze ochronnym obowiązują zasady bioasekuracji opisane w "zasady zachowania bioasekuracji podczas patroszenia", przy czym dopuszcza się patroszenie dzików w łowisku;
- f) Na terenach zlokalizowanych poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia należy dokonywać patroszenia dzików zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań, stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 12/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r., a samo patroszenie wykonać na folii lub innym szczelnym materiale.



ZASADY ZACHOWANIA BIOASEKURACJI W CZASIE PATROSZENIA

- a) Zaleca się dokonywanie patroszenia dzików na folii lub innym, szczelnym materiale;
- b) Miejsce patroszenia należy obficie zdezynfekować środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Dotyczy to także innych miejsc zanieczyszczonych krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu;
- c) Zaleca się umieszczanie patrochów i folii, na której dokonano patroszenia w szczelnym, plastikowym pojemniku lub worku;
- d) Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności należy zdezynfekować dłonie i obuwie.





TRANSPORT TUSZ

Kolejnym etapem postępowania z tuszą pozyskanego dzika jest jego transport do miejsc jego przechowywania.

Za miejsce przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików uważa się punkt skupu dziczyzny lub zakład obróbki dziczyzny lub inny zakład nadzorowany przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i/lub skóry dzików, zlokalizowany na obszarze zagrożenia, obszarze objętym ograniczeniami, obszarze ochronnym, jak również poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF.





ZASADY BIOASEKURACJI W CZASIE PRZEWOŻENIA TUSZ DZIKÓW POZA OBSZAREM OCHRONNYM, OBJĘTYM OGRANICZENIAMI I ZAGROŻENIA ORAZ CAŁYCH DZIKÓW PRZED PATROSZENIEM W OBSZARACH Z MIEJSC POLOWANIA DO MIEJSC PRZETRZYMYWANIA TUSZ.

- a) Środki transportu powinny być odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi;
- b) Środki transportu powinny być wyłożone materiałem jednorazowego użytku lub materiałem wielorazowego użytku nadającym się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji;
- c) Środki transportu nie powinny być wykorzystywane w działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików lub dzików;
- d) Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych dzików, w przypadku gdy nie ma możliwości dojazdu do miejsca dokonania odstrzału;





PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW PRZETRZYMYWANIA TUSZ POZYSKANYCH DZIKÓW W STREFIE ŻÓŁTEJ, CZERWONEJ I NIEBIESKIEJ

Wymagania co do miejsc przetrzymywania tusz dotyczą obszarów ochronnych, objętych ograniczeniami i obszarów zagrożenia.

- a) Punkt przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików powinien być wyposażony w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej;
- b) Tusze przetrzymywane są w chłodni, natomiast patrochy gromadzone są oddzielnie, zapewniając w miarę możliwości ich przetrzymywanie w temperaturze chłodni;
- c) Patrochy oznacza się w sposób pozwalający na ich przyporządkowanie do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni;
- d) W punkcie przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików istnieje obowiązek dokonywania oględzin tusz przez urzędowego lekarza weterynarii;
- e) Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, wszystkie materiały jednorazowego użytku służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem, należy pozostawić przy patrochach, natomiast wszystkie materiały wielorazowego użytku powinny zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji;
- f) Przed opuszczeniem punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, zaleca się również przeprowadzenie mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunków



**ZACHOWANIE ZASAD BIOASEKURACJI PRZY POBIERANIU PRÓBEK
DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF
OD ODSTRZELONYCH DZIKÓW:**

- a) Próbki do badań laboratoryjnych należy pobierać do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu, a następnie umieścić je w worku strunowym i oznakować. Minimalna objętość próbki krwi, wystarczająca do wykonania badań laboratoryjnych wynosi 2 ml.
- b) Należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia.
- c) Wszelkie materiały lub sprzęt użyte do pobierania próbek krwi, po zakończeniu próbkobrania należy umyć a następnie zdezynfekować lub, w razie konieczności, poddać utylizacji.



ZASADY BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

PODSTAWOWE ZASADY

- a) Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem.
- b) Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni.
- c) Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku).
- d) Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.
- e) Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.
- f) Utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.
- g) Zapewnienie aby:
 - osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
- h)
 - do budynków, w których są utrzymywane świnie nie wchodziły osoby postronne,
 - osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.
- i) Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:
 - dokumentację przestrzegania wymagań określonych w pkt 2-4,
 - rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
 - program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
 - zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia, o których mowa w pkt 7 lit. c.
- j) Zabezpieczenie budynków inwentarskich oraz budynków i miejsc wykorzystywanych do przechowywania pasz i ściółki pojedynczym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m na całej długości, związanym na stałe z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwa. Wymagania są spełnione także wtedy gdy całe siedlisko jest ogrodzone w wyżej określony sposób.
- k) Utrzymywanie świń w gospodarstwie w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne.

Źródło: <https://www.topagrar.pl/articles/afrykanski-pomor-swin-asf/kolejne-przypadki-asf-w-woj-wielkopolskim/?fbclid=IwAR0wPdP8EBTjvX9S4xmLu4diiUEdgKjro-NPbt1wruRdkWc2NNFr4yIBcHw>
data wejścia: 17.12.2019r.